

# Reanimatie met AED

1



1. Vraag wat er is gebeurd.  
• Bekijk letsel (zie instructie Levenreddende handelingen)  
• Geen reacties, schudden aan de schouders en roep om hulp.

2



2. • Bel 112  
• WIE... WAT... WAAR  
• Zet de telefoon op luidspreker.  
• AED aanwezig?  
• Laat de AED halen.

3



3. • Kantel het hoofd (kinlift).  
• Kijk/luister/voel naar de ademhaling, max 10 seconden.  
• Ademhaling afwezig naar 4.  
• Ademhaling aanwezig, stabiele zijligging toepassen (zie 6)

4



4. • Plaats de hand midden op het borstbeen  
• Geef 30x borstcompressies tussen de 5 en 6 cm diep.  
• Tempo tusen 100 en 120 per minuut.

5



5. • Pas de beademing toe mond op mond of met hulpmiddelen  
• 2x beademingen  
• Herhaal 4 en 5 tot AED aanwezig is (zie aankomst AED)



6

## STABIELE ZIJLIGGING.

- Controleer elke minuut de ademhaling.  
Als deze stopt slachtoffer direct op de rug leggen  
Ga naar stap 3

# RISK ORGANISATIE

Vinkwijkseweg 22 - 7038 EP ZEDDAM  
T +31 (0)314 - 65 31 01 • info@riskorganisatie.nl

Dependance  
Pinksterbloem 112 - 8607 DZ SNEEK

Dependance  
Kennemerstraatweg 464 - 1851 NG HEILOO

[www.riskorganisatie.nl](http://www.riskorganisatie.nl)

# RISK ORGANISATIE

## REANIMATIE met AED



## Reanimatie met AED



1



Open de AED

4



Plaats de elektroden zoals aangegeven

7



2



Verwijder de kleding

5



7

- Plaats de hand midden op het borstbeen.
- Geef 30x borstcompressies tussen de 5 en 6 cm diep.
- Tempo tussen 100 en 120x per minuut.

8

- Pas de beademing toe.
- Mond-op-mond of met hulpmiddelen.
- 2x effectief beademingen
- **Herhaal stap 7 en 8 tot AED opnieuw gaat analyseren**
- **Hierna weer 7 en 8**

3



Maak de borst droog

6



Raak het slachtoffer niet aan.

De AED gaat analyseren. Volg de instructies van de AED op.

8

